

Le bonnet d'évêque, fruit du Fusain d'Europe

Dimanche Ouest-France, Morbihan

Publié le 09/11/2025 à 10h03



Bonnet d'évêque, fruit du Fusain d'Europe, *Euonymus europaeus*

© Christian Fontaine

Arbuste discret

Le Fusain d'Europe, arbuste commun en Bretagne, croît en lisière des bois frais et dans les haies bocagères. De croissance rapide, il mesure de 2 à 6 mètres. Il produit, dès la fin avril, de petites fleurs blanc-verdâtre très discrètes, la plupart à quatre pétales. Par contre, à l'automne, ses fruits rose vif, de forme très originale, attirent l'attention, tout comme ses feuilles, ovales et dentées, qui prennent, en fin de saison, une teinte rose tyrien à rouge du plus bel effet. Le botaniste suédois Linné l'a nommé *Euonymus*, du grec *eu*, bien, et *onymus*, nom. Cet arbuste serait donc le bien nommé ?

Fruits originaux

Les fruits suspendus, tout d'abord verts, deviennent roses en mûrissant, en octobre. Généralement à quatre lobes, ces fruits joufflus ont l'apparence d'une barrette d'évêque, d'où leur nom. En mûrissant, ces capsules s'ouvrent et laissent apparaître, en novembre, quatre arilles orange vif. Ces enveloppes *flashy* et luisantes entourent, en effet, les graines de fusain, groupées par deux. En automne, la présence ostentatoire de ces fruits, de forme et de couleur originale, facilite l'identification du Fusain d'Europe, sans risque de confusion.

Toxiques mais pas pour tous !

Ces fruits, comme le reste de la plante, sont toxiques pour l'homme et pour certains animaux domestiques, car ils contiennent des substances cardio-toxiques. Ils sont acres et provoquent vomissements et diarrhées.

Cependant, les oiseaux, comme les merles et les grives, s'en nourrissent sans problème. Les rouges-gorges consomment ces petites boules orangées très riches en matières grasses, pour résister au frimas de l'hiver. Les graines rejetées ensuite dans la nature jouent un rôle non négligeable dans l'extension du Fusain d'Europe. Toutefois, il faut attendre une période de froid durable pour lever la dormance des graines.



Fleur du Fusain d'Europe.

© Christian Fontaine

Terreur des poux

Ces bonnets d'évêque et les écorces de l'arbuste ont jadis été utilisés en décoction ou réduits en poudre pour lutter contre les insectes, dont les poux et les puces, vecteurs de maladies et contre les araignées... avis aux arachnophobes ! Fruits tinctoriaux, les bonnets d'évêque teignent en rouge le cuir, la laine et le coton.

Unique représentant

La famille des Célastracées n'est représentée en Bretagne que par une seule espèce, le Fusain d'Europe. Dans le monde, cette famille est riche de plus de 800 espèces, dont le khat. Ce dernier, originaire du Yémen et d'Éthiopie, doit sa renommée à son usage populaire en Arabie. Ses feuilles fraîches mastiquées longuement sont décontractantes et euphorisantes mais sans dépendance. Elles augmentent la résistance à la fatigue et à la faim.



Feuillage automnal du Fusain d'Europe.

© Patrick Camus

Horticulture

Des variétés horticoles du Fusain d'Europe sont commercialisées pour leur aspect décoratif à l'automne. Avec ses bonnets d'évêque colorés, un feuillage rougissant à l'arrière-saison, cet arbuste a toute sa place dans les jardins. Ses arilles fournissent aux oiseaux, une nourriture appréciée et riche.

Bois des artistes et des fileuses

Son bois, carbonisé à l'abri de l'air, donne le fusain utilisé par les artistes. Il a l'avantage de donner des tracés fins, très contrastés et assez facilement effaçables. Le bois du fusain, léger et au grain fin, était utilisé pour fabriquer les fuseaux, *fusus* en latin, des fileuses. Ces usages sont à l'origine du nom commun de cet arbuste.

Boned kornek

Il existe plusieurs noms bretons imagés pour le Fusain d'Europe : glaouenn, gwezenn gwerzhidi, arbres à fuseaux ou plantenn bonedou kornek, plante aux bonnets de curé. Le dernier nom breton mentionne donc, avec boned kornek, la barrette des évêques et des recteurs, analogie explicite entre la forme carrée du couvre-chef ecclésiastique et celle du fruit du fusain.

Patrick Camus
Christian Fontaine